

## Оксалиплатин / Иринотекан ХС672 (европейский протокол) Рак желудка

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м <sup>2</sup>	Растворитель	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения
1,15	Иринотекан	125	0,9% NaCl	500 мл	30 минут	внутривенно
1,15	Оксалиплатин	85	5% Глюкоза	500 мл	2 часа	внутривенно

### График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
<b>Иринотекан</b>																												
■														■														
<b>Оксалиплатин</b>																												
■														■														

### Дополнительная информация

**ПОВТОРНО НА:  
29 (день)**

**КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:  
6**

#### Примечание:

**Внимание! Иринотекан может вызвать опасную для жизни диарею и холинергический синдром. Диарея может возникнуть либо в острой форме, либо в некоторые дни после введения Иринотекана.**

**Сопутствующая медикация: Атропин 0,2 мг подкожно или внутривенно.**

**В случае диареи: Лоперамид, сначала 4 мг, затем по 2 мг каждые 2 часа. Прием Лоперамида следует продолжать еще в течение 12 часов после прекращения диареи. Если она сохраняется более 48 часов или в случае лихорадки, рекомендовано назначение Ципрофлоксацина и госпитализация.**

#### Литература:

**Wöll E. et al., Anticancer Res 28: 2901ff, 2008.**

