

## Базовая ВЕАСОРР ХС144 (сутки 1-3); ХА149 (сутки 8) (европейский протокол) Ходжкинская лимфома

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м <sup>2</sup>	Растворитель	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения
8	Блеомицин	10	-	0	болюс	внутривенно
8	Винкристин	1,4(*)	0,9% NaCl	100 мл	10 минут	внутривенно
1	Доксорубицин	25	0,9% NaCl	250 мл	30 минут	внутривенно
1-14	Преднизон	40	-	0	-	перорально
1-7	Прокарбазин	100	-	0	-	перорально
1	Циклофосфамид	650	0,9% NaCl	500 мл	1 час	внутривенно
1-3	Этопозид	100	0,9% NaCl	500 мл	1 час	внутривенно

### График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
<b>Блеомицин</b>																				
<b>Винкристин</b>																				
<b>Доксорубицин</b>																				
<b>Преднизон</b>																				
<b>Прокарбазин</b>																				
<b>Циклофосфамид</b>																				
<b>Этопозид</b>																				

### Дополнительная информация

ПОВТОРНО НА:  
21 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:  
2

#### Примечание:

**Внимание!** Доксорубицин может быть кардиотоксическим при общей дозе  $\geq 500$  мг/м<sup>2</sup>.

Если общая доза составляет  $\geq 200$  мг, Этопозид растворяют в 1000 мл 0,9% раствора NaCl.

(\*) Винкристин, макс. 2 мг.

Месна: 20% дозы Циклофосфамида, через 0, 4, 8 ч после приема Циклофосфамида (перорально или внутривенно).

Авторы: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#) (руководство «Протоколы химиотерапии 2016. Текущие протоколы и таргетная терапия» (17-е издание, Инсбрук).

Последнее изменение содержания: январь 2016 г.

Литература:

Diehl V. et al., Ann Oncol 8: 143ff, 1997.

