ХЕМОТЕКА
ЦЕНТР ПЕРСОНАЛІЗОВАНОЇ ФАРМАЦІЇ

0800 402 022
050 440 90 62
office@chemoteka.com.ua

вул. Чигиринська, 21/11
Черкаси, 18030, Україна
chemoteka.com

CEOP-IMVP16-DEXA XC236 (сутки 1-5); XC240 (сутки 15-19); XC244 (сутки 22) (европейский протокол) НХЛ острая

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м^2	Растворитель	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения
1,8,9	Винкристин	1,4(*)	0,9% NaCl	100 мл	1 годину	внутривенно
15-19	Дексаметазон	40	-	0	30 хвилин	перорально
15-17	Ифосфамид	2000	0,9% NaCl	500 мл	10 хвилин	внутривенно
22	Метотрексат	800	0,9% NaCl	1000 мл	-	внутривенно
1-5	Преднизон	100 (const)	-	0	1 годину	перорально
1	Циклофосфамид	750	0,9% NaCl	500 мл	2 години	внутривенно
1-5	Эпирубицин	70	0,9% NaCl	250 мл	-	внутривенно
15-17	Этопозид	100	0,9% NaCl	500 мл	4 години	внутривенно

График введения препаратов:



Дополнительная информация

ПОВТОРНО НА:
29 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:
8

Примечание:
Месна: 150 мг/м2 в 500 мл 0,9% раствора NaCl в течение 30 минут сразу после приема Циклофосфамида, затем 750 мг/м2 в течение 12 часов. (начиная с приема Циклофосфамида).
(*) Винкристин, макс. 2 мг.
Внимание! Эпирубицин может быть кардиотоксичным при общей дозе ≥1000 мг/м2.
Кальций фолинат: 15 мг/м2 перорально каждые 6 часов на 23-25 сутки.
Если общая доза составляет ≥200 мг, Этопозид растворяют в 1000 мл 0,9% раствора NaCl.
Литература:
Fridrik MA., J Clin Oncol 14: 227ff, 1996.