

СЕОР-IMVP16-DEXA ХС236 (сутки 1-5); ХС240 (сутки 15-19); ХС244 (сутки 22) (европейский протокол) НХЛ острая

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м ²	Растворитель	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения
1,8,10	Винкристин	1,4(*)	0,9% NaCl	100 мл	1 годину	внутривенно
22	Метотрексат	800	0,9% NaCl	1000 мл	-	внутривенно
1	Циклофосфамид	750	0,9% NaCl	500 мл	2 години	внутривенно

График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Винкристин																												
█							█		█																			
Метотрексат																												
																						█						
Циклофосфамид																												
█																												

Дополнительная информация

**ПОВТОРНО НА:
29 (день)**

**КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:
8**

Примечание:

Месна: 150 мг/м² в 500 мл 0,9% раствора NaCl в течение 30 минут сразу после приема

Циклофосфамида, затем 750 мг/м² в течение 12 часов. (начиная с приема Циклофосфамида).

(*) Винкристин, макс. 2 мг.

Внимание! Эпирубицин может быть кардиотоксичным при общей дозе ≥1000 мг/м².

Кальций фолинат: 15 мг/м² перорально каждые 6 часов на 23-25 сутки.

Если общая доза составляет ≥200 мг, Этопозид растворяют в 1000 мл 0,9% раствора NaCl.

Литература:

Fridrik MA., J Clin Oncol 14: 227ff, 1996.

