

## Цисплатин / Винорельбин (локальний протокол) Рак легких

Дни терапії	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м <sup>2</sup>	Растворитель	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения
1, 8	Винорелбин	30	0,9% NaCl	100 мл	10 минут	внутривенно
1	Цисплатин	80	0,9% NaCl	1000 мл	2 часа	внутривенно

### График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
<b>Винорелбин</b>																					
<b>Цисплатин</b>																					

### Дополнительная информация

**Примечание:**

**Цисплатин (только если СКФ ≥60 мл/мин.):**

**Сопутствующая медикация:**

**Премедикация:** 500 мл 0,9% раствора NaCl + 10 мЭкв KCl + 8 мЭкв MgSO<sub>4</sub> внутривенно в течение 60 мин.

200 мл 20% раствора Маннита в течение 30 мин.

**Постмедикация:** 500 мл 0,9% раствора NaCl внутривенно + 10 мЭкв KCl.

**Винорелбин** вводится быстро внутривенно.

(Внимание! Тромбофлебит; угроза некроза после экстравазации, поэтому желательно применение катетера "Port-A-Cath").

После чего 250 мл 0,9% раствора NaCl внутривенно.

**Паспортная часть:** нозология - рак легкого; код по мкб -10 - с 33, с 34.

**Потенциальные пользователи** - отделение опухолей органов грудной полости Национального института рака.

**Авторство:** [Национальный институт рака](#)

**Литература:**

Локальный протокол медицинской помощи и клинический маршрут больных раком легкого.

**ПОВТОРНО НА:  
22 (день)**

**КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:  
6**

