

Цисплатин / Винорельбин (локальний протокол) Рак легких

Дни терапії	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м ²	Растворитель	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения
1, 8	Винорелбин	30	0,9% NaCl	100 мл	10 минут	внутривенно
1	Цисплатин	80	0,9% NaCl	1000 мл	2 часа	внутривенно

График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Винорелбин																					
Цисплатин																					

Дополнительная информация

Примечание:

Цисплатин (только если СКФ ≥60 мл/мин.):

Сопутствующая медикация:

Премедикация: 500 мл 0,9% раствора NaCl + 10 мЭкв KCl + 8 мЭкв MgSO₄ внутривенно в течение 60 мин.

200 мл 20% раствора Маннита в течение 30 мин.

Постмедикация: 500 мл 0,9% раствора NaCl внутривенно + 10 мЭкв KCl.

Винорелбин вводится быстро внутривенно.

(Внимание! Тромбофлебит; угроза некроза после экстравазации, поэтому желательно применение катетера "Port-A-Cath").

После чего 250 мл 0,9% раствора NaCl внутривенно.

Паспортная часть: нозология - рак легкого; код по мкб -10 - с 33, с 34.

Потенциальные пользователи - отделение опухолей органов грудной полости Национального института рака.

Авторство: [Национальный институт рака](#)

Литература:

Локальный протокол медицинской помощи и клинический маршрут больных раком легкого.

**ПОВТОРНО НА:
22 (день)**

**КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:
6**

