

## Цисплатин / Винорельбин (локальный протокол) Рак легких

| Дни терапии  | Лекарственное средство | Дозировка, мг/м <sup>2</sup> | Растворитель | Объем (мл / шт) | Время введения | Путь введения |
|--------------|------------------------|------------------------------|--------------|-----------------|----------------|---------------|
| 1, 8, 15, 22 | Винорелбин             | 25                           | 0,9% NaCl    | 100 мл          | 10 минут       | внутривенно   |
| 1            | Цисплатин              | 100                          | 0,9% NaCl    | 1000 мл         | 2 часа         | внутривенно   |

### График введения препаратов:

| 1                 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| <b>Винорелбин</b> |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| ■                 |   |   |   |   |   |   | ■ |   |    |    |    |    |    | ■  |    |    |    |    |    |    | ■  |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Цисплатин</b>  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| ■                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

### Дополнительная информация

**Примечание:**

**Цисплатин (только если СКФ ≥60 мл/мин.):**

**Сопутствующая медикация:**

**Премедикация:** 500 мл 0,9% раствора NaCl + 10 мЭкв KCl + 8 мЭкв MgSO<sub>4</sub> внутривенно в течение 60 мин.

200 мл 20% раствора Маннита в течение 30 мин.

**Постмедикация:** 500 мл 0,9% раствора NaCl внутривенно + 10 мЭкв KCl.

**Винорелбин** вводится быстро внутривенно.

**(Внимание! Тромбофлебит; угроза некроза после экстравазации, поэтому желательно применение катетера "Port-A-Cath").**

После чего 250 мл 0,9% раствора NaCl внутривенно.

**Паспортная часть:** нозология - рак легкого; код по мкб -10 - с 33, с 34.

**Потенциальные пользователи - отделение опухолей органов грудной полости Национального института рака.**

**Авторство:** [Национальный институт рака](#)

**Литература:**

**Локальный протокол медицинской помощи и клинический маршрут больных раком легкого.**

**ПОВТОРНО НА:  
29 (день)**

**КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:  
6**

