

## Цисплатин / Винорельбин (локальный протокол) Рак легких

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м <sup>2</sup>	Растворитель	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения
1, 8, 15, 22	Винорелбин	25	0,9% NaCl	100 мл	10 минут	внутривенно
1	Цисплатин	100	0,9% NaCl	1000 мл	2 часа	внутривенно

### График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
<b>Винорелбин</b>																												
■							■							■							■							
<b>Цисплатин</b>																												
■																												

### Дополнительная информация

ПОВТОРНО НА:  
29 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:  
6

#### Примечание:

Цисплатин (только если СКФ  $\geq 60$  мл/мин.):

Сопутствующая медикация:

Премедикация: 500 мл 0,9% раствора NaCl + 10 мЭкв KCl + 8 мЭкв MgSO<sub>4</sub> внутривенно в течение 60 мин.

200 мл 20% раствора Маннита в течение 30 мин.

Постмедикация: 500 мл 0,9% раствора NaCl внутривенно + 10 мЭкв KCl.

Винорелбин вводится быстро внутривенно.

(Внимание! Тромбофлебит; угроза некроза после экстравазации, поэтому желательно применение катетера "Port-A-Cath").

После чего 250 мл 0,9% раствора NaCl внутривенно.

Паспортная часть: нозология - рак легкого; код по мкб -10 - с 33, с 34.

Потенциальные пользователи - отделение опухолей органов грудной полости Национального института рака.

Авторство: [Национальный институт рака](#)

Литература:

Локальный протокол медицинской помощи и клинический маршрут больных раком легкого.

