

Мелфалан / Преднизон / Бортезомиб ХА020 (европейский протокол) Множественная миелома

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м ²	Растворитель	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения
1, 4, 8, 11, 22, 25, 29, 32	Бортезомиб	1,3	-	0	болюс	внутривенно
1-4	Мелфалан	9	-	0	-	перорально
1-4	Преднизон	60	-	0	-	перорально

График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Бортезомиб																														
■			■				■				■										■			■						■
Мелфалан																														
■	■	■	■																											
Преднизон																														
■	■	■	■																											

Дополнительная информация

ПОВТОРНО НА:
43 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:
9

Примечание:

Начиная с 5-го цикла и во всех последующих циклах Бортезомиб вводят только в дозах 1, 8, 22, 29.

Бортезомиб также можно вводить подкожно (концентрация: 2,5 мг/мл).

Авторы: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#) (руководство «Протоколы химиотерапии 2016. Текущие протоколы и таргетная терапия» (17-е издание, Инсбрук).

Последнее изменение содержания: январь 2016 г.

Литература:

San Miguel J.F. et al., N Engl J Med 359: 906ff, 2008;
Moreau P. et al., Lancet Oncol 12: 431ff, 2011.

