

## Гемцитабин (локальний протокол) Рак легких

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м <sup>2</sup>	Растворитель	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения
1, 8, 15	Гемцитабин	1000	0,9% NaCl	250 мл	30 минут	внутривенно

### График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Гемцитабин																												
■							■							■														

### Дополнительная информация

ПОВТОРНО НА:  
29 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:  
6

#### Примечание:

Повторно: \* Первый цикл следует прекратить раньше в случае негематологической токсичности  $\geq 2$  степени или  $\geq 3$  степени гематологической токсичности; затем на 1, 8 и 15 сутки, с повтором на 29 сутки.

Повторно: через 28 суток.

Паспортная часть: нозология - рак легкого; код по МКБ -10 - с 33, с 34.

Потенциальные пользователи - отделение опухолей органов грудной полости Национального института рака.

Авторство: [Национальный институт рака](#)

#### Литература:

Локальный протокол медицинской помощи и клинический маршрут больных раком легкого.

