

Цисплатин / Эрлотиниб (локальный протокол) Мелкоклеточный рак легкого - МРЛ

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м ²	Растворитель	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения
1	Цисплатин	75	0,9% NaCl	1000 мл	2 часа	внутривенно
1, 3	Эрлотиниб	100 (const)	-	-	-	перорально

График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Цисплатин																												
Эрлотиниб																												

Дополнительная информация

**ПОВТОРНО НА:
29 (день)**

**КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:
6**

Примечание:

Цисплатин (только если СКФ ≥ 60 мл/мин.):

Сопутствующая медикация:

Премедикация: 500 мл 0,9% раствора NaCl + 10 мЭкв KCl + 8 мЭкв MgSO₄ внутривенно в течение 60 мин.

200 мл 20% раствора Маннита в течение 30 мин.

Постмедикация: 500 мл 0,9% раствора NaCl внутривенно + 10 мЭкв KCl.

Паспортная часть: нозология - рак легкого; код по МКБ -10 - с 33, с 34.

Потенциальные пользователи - отделение опухолей органов грудной полости Национального института рака.

Авторство: [Национальный институт рака](#)

Литература:

Локальный протокол медицинской помощи и клинический маршрут больных раком легкого.

