

## Бортезомиб / Талидомид / Дексаметазон ХА020 (европейский протокол) Множественная миелома

| Дни терапии              | Лекарственное средство | Дозировка, мг/м <sup>2</sup> | Растворитель | Объем (мл / шт) | Время введения | Путь введения |
|--------------------------|------------------------|------------------------------|--------------|-----------------|----------------|---------------|
| 1, 4, 8, 11              | Бортезомиб             | 1,3                          | -            | 0               | -              | подкожно      |
| 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12 | Дексаметазон           | 40 (const)                   | -            | 0               | -              | перорально    |
| 1-21                     | Талидомид              | 100 мг (const)               | -            | 0               | -              | перорально    |

### График введения препаратов:

| 1                   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| <b>Бортезомиб</b>   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| ■                   |   |   | ■ |   |   |   | ■ |   |    | ■  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Дексаметазон</b> |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| ■                   | ■ |   | ■ | ■ |   |   | ■ | ■ |    | ■  | ■  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Талидомид</b>    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| ■                   | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |

### Дополнительная информация

ПОВТОРНО НА:  
22 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:  
3

Повторно: Сутки 22 (\*) - длительный прием.

Количество циклов: 3.

Примечание:

(\*\*) 100 мг талидомида каждые сутки в течение первых 14 дней, затем по 200 мг Талидомида каждые сутки.

Рекомендована профилактика образования тромбов.

Концентрация Бортезомиба - 2,5 мг/мл.

Авторы: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#)

(руководство «Протоколы химиотерапии 2016. Текущие протоколы и таргетная терапия» (17-е издание, Инсбрук).

Последнее изменение содержания: январь 2016 г.

Литература:

Cavo M. et al., Lancet 376: 2075ff, 2010.

