

## Бортезомиб / Талидомид / Дексаметазон ХА020 (европейский протокол) Множественная миелома

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м <sup>2</sup>	Растворитель	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения
1, 4, 8, 11	Бортезомиб	1,3	-	0	-	подкожно
1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12	Дексаметазон	40 (const)	-	0	-	перорально
1-21	Талидомид	100 мг (const)	-	0	-	перорально

### График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
<b>Бортезомиб</b>																					
■			■				■			■											
<b>Дексаметазон</b>																					
■	■		■	■			■	■		■	■										
<b>Талидомид</b>																					
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

### Дополнительная информация

ПОВТОРНО НА:  
22 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:  
3

Повторно: Сутки 22 (\*) - длительный прием.

Количество циклов: 3.

Примечание:

(\*\*) 100 мг талидомида каждые сутки в течение первых 14 дней, затем по 200 мг Талидомида каждые сутки.

Рекомендована профилактика образования тромбов.

Концентрация Бортезомиба - 2,5 мг/мл.

Авторы: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#)

(руководство «Протоколы химиотерапии 2016. Текущие протоколы и таргетная терапия» (17-е издание, Инсбрук).

Последнее изменение содержания: январь 2016 г.

Литература:

Cavo M. et al., Lancet 376: 2075ff, 2010.

