

## Цисплатин / Эрлотиниб (локальный протокол) Мелкоклеточный рак легкого - МРЛ

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м <sup>2</sup>	Растворитель	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения
1, 3	Цисплатин	25	0,9% NaCl	1000 мл	2 часа	внутривенно
1, 3	Эрлотиниб	100	-	-	-	перорально

### График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
<b>Цисплатин</b>																												
■		■																										
<b>Эрлотиниб</b>																												
■		■																										

### Дополнительная информация

**ПОВТОРНО НА:  
29 (день)**

**КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:  
6**

#### Примечание:

**Цисплатин (только если СКФ ≥ 60 мл/мин.):**

**Сопутствующая медикация:**

**Премедикация: 500 мл 0,9% раствора NaCl + 10 мЭкв KCl + 8 мЭкв MgSO<sub>4</sub> внутривенно в течение 60 мин.**

**200 мл 20% раствора Маннита в течение 30 мин.**

**Постмедикация: 500 мл 0,9% раствора NaCl внутривенно + 10 мЭкв KCl.**

**Паспортная часть: нозология - рак легкого; код по МКБ -10 - с 33, с 34.**

**Потенциальные пользователи - отделение опухолей органов грудной полости Национального института рака.**

**Авторство: [Национальный институт рака](#)**

**Литература:**

**Локальный протокол медицинской помощи и клинический маршрут больных раком легкого.**

