

## Цисплатин / Ирриотекан (локальний протокол) Мелкоклеточний рак легкого - МРЛ

Дни терапії	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м <sup>2</sup>	Растворитель	Объем (мл)	Время введения	Путь введения
1, 8	Ирриотекан	65	0,9% NaCl	250	90 минут	внутривенно
1, 8	Цисплатин	30	0,9% NaCl	500	1 час	внутривенно

### График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
<b>Ирриотекан</b>																												
■							■																					
<b>Цисплатин</b>																												
■							■																					

### Дополнительная информация

**Примечание:****Цисплатин (только если СКФ ≥60 мл/мин.):****Сопутствующая медикация:****Премедикация: 500 мл 0,9% раствора NaCl + 10 мЭкв KCl + 8 мЭкв MgSO<sub>4</sub> внутривенно в течение 60 мин.****200 мл 20% раствора Маннита в течение 30 мин.****Постмедикация: 500 мл 0,9% раствора NaCl внутривенно + 10 мЭкв KCl.****Внимание! Ирриотекан может вызвать опасную для жизни диарею и холинергический синдром. Диарея может возникнуть либо в острой форме, либо в некоторые дни после введения Ирриотекана.****Сопутствующая медикация: Атропин 0,2 мг подкожно или внутривенно****В случае диареи: Лоперамид, сначала 4 мг, затем по 2 мг каждые 2 часа. Прием Лоперамида следует продолжать еще в течение 12 часов после прекращения диареи. Если она сохраняется более 48 часов или в случае лихорадки, рекомендовано назначение Ципрофлоксацина и госпитализация.****Паспортная часть: нозология - рак легкого; код по МКБ -10 - с 33, с 34.****Потенциальные пользователи - отделение опухолей органов грудной полости Национального института рака.****Литература:****Локальный протокол медицинской помощи и клинический маршрут больных раком легкого.****ПОВТОРНО НА:  
29 (день)****КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:  
6**