

## Карбоплатин / Этопозид (локальный протокол) Мелкоклеточный рак легкого - МРЛ

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м <sup>2</sup>	Растворитель	Объем (мл)	Время введения	Путь введения
1	Карбоплатин	AUC 6	5% Глюкоза	500	30 минут	внутривенно
1, 3	Этопозид	100	0,9% NaCl	500	1 час	внутривенно

### График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
<b>Карбоплатин</b>																												
■																												
<b>Этопозид</b>																												
■	■																											

### Дополнительная информация

ПОВТОРНО НА:  
29 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:  
6

#### Примечание:

Расчет дозы Карбоплатина (формула Calvert):

Доза (мг) = целевая AUC x (СКФ + 25).

Если общая доза составляет  $\geq 200$  мг, Этопозид растворяют в 1000 мл 0,9% раствора NaCl.

Паспортная часть: нозология - рак легкого; код по МКБ -10 - с 33, с 34.

Потенциальные пользователи - отделение опухолей органов грудной полости Национального института рака.

#### Литература:

Локальный протокол медицинской помощи и клинический маршрут больных раком легкого.

