

Карбоплатин / Этопозид (локальный протокол) Мелкоклеточный рак легкого - МРЛ

| Дни терапии | Лекарственное средство | Дозировка, мг/м ² | Растворитель | Объем (мл / шт) | Время введения | Путь введения |
|-------------|------------------------|------------------------------|--------------|-----------------|----------------|---------------|
| 1 | Карбоплатин | AUC 6 | 5% Глюкоза | 500 мл | 30 минут | внутривенно |
| 1, 3 | Этопозид | 100 | 0,9% NaCl | 500 мл | 1 час | внутривенно |

График введения препаратов:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Карбоплатин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Этопозид | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Дополнительная информация

**ПОВТОРНО НА:
29 (день)**

**КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:
6**

Примечание:

Расчет дозы Карбоплатина (формула Calvert):

Доза (мг) = целевая AUC x (СКФ + 25).

Если общая доза составляет ≥ 200 мг, Этопозид растворяют в 1000 мл 0,9% раствора NaCl.

Паспортная часть: нозология - рак легкого; код по мкб -10 - с 33, с 34.

Потенциальные пользователи - отделение опухолей органов грудной полости Национального института рака.

Авторство: [Национальный институт рака](#)

Литература:

Локальный протокол медицинской помощи и клинический маршрут больных раком легкого.

