

Карбоплатин / Ирриотекан (локальний протокол) Мелкоклеточний рак легкого - МРЛ

Дни терапії	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м ²	Растворитель	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения
1, 8, 15	Ирриотекан	50	0,9% NaCl	250 мл	90 минут	внутривенно
1	Карбоплатин	AUC 5	5% Глюкоза	500 мл	30 минут	внутривенно

График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Ирриотекан																												
■							■							■														
Карбоплатин																												
■																												

Дополнительная информация

Примечание:

Расчет дозы Карбоплатина (формула Calvert):

Доза (мг) = целевая AUC x (СКФ + 25).

Внимание! Ирриотекан может вызвать опасную для жизни диарею и холинергический синдром. Диарея может возникнуть либо в острой форме, либо в некоторые дни после введения Ирриотекана.

Сопутствующая медикация: Атропин 0,2 мг подкожно или внутривенно

В случае диареи: Лоперамид, сначала 4 мг, затем по 2 мг каждые 2 часа. Прием Лоперамида следует продолжать еще в течение 12 часов после прекращения диареи. Если она сохраняется более 48 часов или в случае лихорадки, рекомендовано назначение Ципрофлоксацина и госпитализация.

Паспортная часть: нозология - рак легкого; код по МКБ -10 - с 33, с 34.

Потенциальные пользователи - отделение опухолей органов грудной полости Национального института рака.

Авторство: [Национальный институт рака](#)

Литература:

Локальный протокол медицинской помощи и клинический маршрут больных раком легкого.

**ПОВТОРНО НА:
29 (день)**

**КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:
6**

