

# Циклофосфамид / Доксорубицин / Этопозид (локальный протокол) Мелкоклеточный рак легкого - МРЛ

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м <sup>2</sup>	Растворитель	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения
1	Доксорубицин	45	0,9% NaCl	500 мл	1 час	внутривенно
1	Циклофосфамид	1000	0,9% NaCl	1000 мл	2 часа	внутривенно
1-3	Этопозид	100	0,9% NaCl	500 мл	1 час	внутривенно

## График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
<b>Доксорубицин</b>																												
<b>Циклофосфамид</b>																												
<b>Этопозид</b>																												

## Дополнительная информация

ПОВТОРНО НА:  
29 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:  
6

### Примечание:

**Внимание! Доксорубицин может быть кардиотоксичным при общем количестве доз  $\geq 500$  мг/м<sup>2</sup>.**

**Месна: 20% дозы Циклофосфамида внутривенно или орально через 0, 4, 8 часов после приема Циклофосфамида. Надлежащий диурез.**

**Если общая доза составляет  $\geq 200$  мг, Этопозид растворяют в 1000 мл 0,9% раствора NaCl.**

**Паспортная часть: нозология - рак легкого; код по мкб -10 - с 33, с 34.**

**Потенциальные пользователи - отделение опухолей органов грудной полости Национального института рака.**

**Авторство: [Национальный институт рака](#)**

**Литература:**

**Локальный протокол медицинской помощи и клинический маршрут больных раком легкого.**

