chemoteka.com



ECF: Цисплатин / Флюороурацил / Эпирубицин (локальный протокол) Опухоли желудочно-кишечного тракта

Дни терапии	Лекарствен ное средство	Дозировка, мг/м²	Растворите ль	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения		
1-21	Флюороурац ил	200	0,9% NaCl	1000 мл	24 часа	внутривенно		
1	Цисплатин	60	0,9% NaCl	1000 мл	2 часа	внутривенно		
1	Эпирубицин	50	0,9% NaCl	250 мл	30 минут	внутривенно		

График введения препаратов:

н	2	3	4	2	9	7	8	6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Флюороурацил																					
Цисплатин																					
Эпирубицин																					

Дополнительная информация

повторно на: **22 (день)**

количество циклов: 6

Примечание:

Внимание! Эпирубицин может быть кардиотоксичным при общем количестве доз ≥1000 мг/м².

Цисплатин (только если СКФ ≥60 мл/мин.):

Сопутствующая медикация:

Премедикация: 500 мл 0,9% раствора NaCl + 10 мЭкв KCl + 8 мЭкв MgSO $_4$ внутривенно в течение 60 мин. 200 мл 20% раствора Маннита в течение 30 мин. Постмедикация: 500 мл 0,9% раствора NaCl

внутривенно + 10 мЭкв КСІ.

Авторство: <u>Национальный институт рака</u>

