

Модифікація ЕСF: Оксалиплатин / Флюороурацил / Епирубицин (локальний протокол) Опухоли желудочно-кишечного тракта

Дни терапії	Лекарствен- ное средство	Дозировка, мг/м ²	Растворите- ль	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения
1	Оксалиплатин	130	5% Глюкоза	500 мл	2 часа	внутривенно
1-21	Флюороурацил	200	0,9% NaCl	500 мл	22 часа	внутривенно
1	Эпирубицин	50	0,9% NaCl	250 мл	30 минут	внутривенно

График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Оксалиплатин																					
Флюороурацил																					
Эпирубицин																					

Дополнительная информация

ПОВТОРНО НА:
22 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:
6

Примечание:

Внимание! Эпирубицин может быть кардиотоксичным при общем количестве доз ≥ 1000 мг/м².

В качестве адъювантной терапии, Оксалиплатин назначают в дозе 130 мг/м² в первые сутки (повторно на 21 сутки).

Авторство: [Национальный институт рака](#)

