

## Оксалиплатин / Эпирубицин / Капецитабин (локальный протокол) Опухоли желудочно- кишечного тракта

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м <sup>2</sup>	Растворитель	Объем (мл)	Время введения	Путь введения
1-21	Капецитабин	625	-	-	-	перорально
1	Оксалиплатин	130	5% Глюкоза	500	2 часа	внутривенно
1	Эпирубицин	50	0,9% NaCl	250	30 минут	внутривенно

### График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
<b>Капецитабин</b>																					
<b>Оксалиплатин</b>																					
<b>Эпирубицин</b>																					

### Дополнительная информация

ПОВТОРНО НА:  
22 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:  
6

#### Примечание:

**Внимание!** Эпирубицин может быть кардиотоксичным при общем количестве доз  $\geq 1000$  мг/м<sup>2</sup>.

Капецитабин: в дозе 625 мг/м<sup>2</sup> принимают 1 раз в сутки с утра, через 30 минут после приема пищи.

**Обратите внимание!**

• Капецитабин (Capecitabini). Капсулы. Дозировки ЦПФ «Хемотека»: 150 мг, 250 мг, 500 мг.

Количество капсул в упаковке: 60 шт., 120 шт.

Возможно изготовление индивидуального количества капсул в упаковке.

