

Оксалиплатин / Эпирубицин / Капецитабин (локальный протокол) Опухоли желудочно- кишечного тракта

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м ²	Растворитель	Объем (мл)	Время введения	Путь введения
1-21	Капецитабин	625	-	-	-	перорально
1	Оксалиплатин	130	5% Глюкоза	500	2 часа	внутривенно
1	Эпирубицин	50	0,9% NaCl	250	30 минут	внутривенно

График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Капецитабин																					
Оксалиплатин																					
Эпирубицин																					

Дополнительная информация

ПОВТОРНО НА:
22 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:
6

Примечание:

Внимание! Эпирубицин может быть кардиотоксичным при общем количестве доз ≥ 1000 мг/м².

Капецитабин: в дозе 625 мг/м² принимают 1 раз в сутки с утра, через 30 минут после приема пищи.

Обратите внимание!

• Капецитабин (Capecitabini). Капсулы. Дозировки ЦПФ «Хемотека»: 150 мг, 250 мг, 500 мг.

Количество капсул в упаковке: 60 шт., 120 шт.

Возможно изготовление индивидуального количества капсул в упаковке.

