

## Оксалиплатин / Эпирубицин / Капецитабин (локальный протокол) Опухоли желудочно-кишечного тракта

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м <sup>2</sup>	Растворитель	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения
1-21	Капецитабин	625	-	-	-	перорально
1	Оксалиплатин	130	5% Глюкоза	500 мл	2 часа	внутривенно
1	Эпирубицин	50	0,9% NaCl	250 мл	30 минут	внутривенно

### График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
<b>Капецитабин</b>																					
<b>Оксалиплатин</b>																					
<b>Эпирубицин</b>																					

### Дополнительная информация

ПОВТОРНО НА:  
22 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:  
6

#### Примечание:

**Внимание!** Эпирубицин может быть кардиотоксичным при общем количестве доз  $\geq 1000$  мг/м<sup>2</sup>.

Капецитабин: в дозе 625 мг/м<sup>2</sup> принимают 1 раз в сутки с утра, через 30 минут после приема пищи.

Авторство: [Национальный институт рака](#)

