

XELOX: Оксалиплатин / Капецитабин (локальний протокол) Опухоли жодудочно-кишечного тракта

Дни терапії	Лекарственне средство	Дозировка, мг/м ²	Растворитель	Объем (мл)	Время введения	Путь введения
1-14	Капецитабин	1000	-	-	-	перорально
1	Оксалиплатин	130	5% Глюкоза	500	2 часа	внутривенно

График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Капецитабин																					
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
Оксалиплатин																					
■																					

Дополнительная информация

ПОВТОРНО НА:
22 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:
6

Примечание:

Капецитабин в дозе 1000 г/м² разделяют на 2 равные дозы - утреннюю и вечернюю, через 30 минут после приема пищи.

Обратите внимание!

- Капецитабин (Capecitabini). Капсулы. Дозировки ЦПФ «Хемотека»: 150 мг, 250 мг, 500 мг. Количество капсул в упаковке: 60 шт., 120 шт. Возможно изготовление индивидуального количества капсул в упаковке.

