

## Модифікація XELOX: Цисплатин / Капецитабин (локальний протокол) Опухоли жодудочно-кишечного тракту

Дни терапії	Лекарственне средство	Дозировка, мг/м <sup>2</sup>	Растворитель	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения
1-14	Капецитабин	1000	-	-	-	перорально
1	Цисплатин	60	0,9% NaCl	1000 мл	2 часа	внутривенно

### График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
<b>Капецитабин</b>																						
<b>Цисплатин</b>																						

### Дополнительная информация

**ПОВТОРНО НА:  
22 (день)**

**КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:  
6**

#### Примечание:

Капецитабин 1000 г/м<sup>2</sup> разделяют на 2 равные дозы - утреннюю и вечернюю, через 30 минут после приема пищи.

Цисплатин (только если СКФ ≥ 60 мл/мин.):

Сопутствующая медикация:

Премедикация: 500 мл 0,9% раствора NaCl + 10 мЭкв KCl + 8 мЭкв MgSO<sub>4</sub> внутривенно в течение 60 мин.

200 мл 20% раствора Маннита в течение 30 мин.

Постмедикация: 500 мл 0,9% раствора NaCl внутривенно + 10 мЭкв KCl.

Авторство: [Национальный институт рака](#)

