

## Модифікація ХЕЛОХ: Цисплатин / Капецитабин (локальний протокол) Опухоли жовудочно- кишечного тракта

Дни терапії	Лекарствен- ное средство	Дозировка, мг/м <sup>2</sup>	Растворите- ль	Объем (мл)	Время введения	Путь введения
1-14	Капецитабин	1000	-	-	-	перорально
1	Цисплатин	60	0,9% NaCl	1000	2 часа	внутривенно

### График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
<b>Капецитабин</b>																					
<b>Цисплатин</b>																					

### Дополнительная информация

ПОВТОРНО НА:  
22 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:  
6

#### Примечание:

Капецитабин 1000 г/м<sup>2</sup> разделяют на 2 равные дозы - утреннюю и вечернюю, через 30 минут после приема пищи.

Цисплатин (только если СКФ ≥60 мл/мин.):

Сопутствующая медикация:

Премедикация: 500 мл 0,9% раствора NaCl + 10 мЭкв KCl + 8 мЭкв MgSO<sub>4</sub> внутривенно в течение 60 мин.

200 мл 20% раствора Маннита в течение 30 мин.

Постмедикация: 500 мл 0,9% раствора NaCl внутривенно + 10 мЭкв KCl.

Обратите внимание!

• Капецитабин (Capecitabini). Капсулы. Дозировки ЦПФ «Хемотека»: 150 мг, 250 мг, 500 мг.

Количество капсул в упаковке: 60 шт., 120 шт.

Возможно изготовление индивидуального количества капсул в упаковке.

