ХЕМОТЕКА
ЦЕНТР ПЕРСОНАЛІЗОВАНОЇ ФАРМАЦІЇ

0800 402 022
050 440 90 62
office@chemoteka.com.ua

вул. Чигиринська, 21/11
Черкаси, 18030, Україна
chemoteka.com

Пегилированный липосомальный доксорубицин / Бортезомиб XC452 + XA020 (европейский протокол) Множественная миелома

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м^2	Растворитель	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения
1,4,8,11	Бортезомиб	1,3	-	0	болюс	внутривенно
4	Пегилированный липосомальный доксорубицин	30	5% Глюкоза	250 мл	1 час	внутривенно

График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Бортезомиб																												
■			■				■			■																		
Пегилированный липосомальный доксорубицин																												
			■																									

Дополнительная информация

ПОВТОРНО НА:
29 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:
8

Примечание:
Пегилированный липосомальный доксорубицин растворяют в 500 мл 5% глюкозы, если общая доза превышает 90 мг.
Бортезомиб также можно вводить подкожно (концентрация: 2,5 мг/мл).
Авторы: Thomas Kühr, Ewald Wöll, Josef Thaler (руководство «Протоколы химиотерапии 2016. Текущие протоколы и таргетная терапия» (17-е издание, Инсбрук).
Последнее изменение содержания: январь 2016 г.
Литература:

Orlowski R.Z. et al., J Clin Oncol 25: 3892ff, 2007;
Moreau P. et al., Lancet Oncol 12: 431ff, 2011.