

## Карфилзомиб / Леналидомид / Дексаметазон ХА149 (европейский протокол) Множественная миелома

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м <sup>2</sup>	Растворитель	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения
1, 8, 15, 22	Дексаметазон	40	-	0	-	перорально
1, 2, 8, 9, 15, 16	Карфилзомиб	20*	5% Глюкоза	250 мл	30 минут	внутривенно
1-21	Леналидомид	25 мг (const)	-	0	-	перорально

### График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
<b>Дексаметазон</b>																												
█							█							█							█							
<b>Карфилзомиб</b>																												
█	█						█	█						█	█													
<b>Леналидомид</b>																												
█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█

### Дополнительная информация

ПОВТОРНО НА:  
29 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:  
2

#### Примечание:

Карфилзомиб назначают с начальной дозой 20 мг/м<sup>2</sup> в первом цикле на первые и вторые сутки. При хорошей переносимости дозу увеличивают до 27 мг/м<sup>2</sup> на 8-е сутки 1 цикла.

До начала 1 цикла необходима надлежащая гидратация, особенно у пациентов с высоким риском синдрома распада опухоли или нефротоксичности.

Рекомендована профилактика образования тромбов.

Авторы: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#) (руководство «Протоколы химиотерапии 2016. Текущие протоколы и таргетная терапия» (17-е издание, Инсбрук).  
Последнее изменение содержания: январь 2016 г.

#### Литература:

Stewart A.K. et al., N Engl J Med 372: 142ff, 2015.

