

Гемцитабин / Цисплатин ХС592 (сутки 1), ХС592 (сутки 8) (европейский протокол) Рак молочной железы

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м ²	Растворитель	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения
1,8	Гемцитабин	750	0,9% NaCl	250 мл	30 хвилин	внутривенно
1,8	Цисплатин	30	0,9% NaCl	500 мл	1 година	внутривенно

График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Гемцитабин																					
■							■														
Цисплатин																					
■							■														

Дополнительная информация

ПОВТОРНО НА:
22 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:
6

Примечание:

Цисплатин (только если СКФ ≥ 60 мл/мин.):

Сопутствующая медикация:

Премедикация: 500 мл 0,9% раствора NaCl + 10 мЭкв KCl + 8 мЭкв MgSO₄ внутривенно в течение 60 мин.

200 мл 20% раствора Маннита в течение 30 мин.

Постмедикация: 500 мл 0,9% раствора NaCl внутривенно + 10 мЭкв KCl.

Литература:

Nagourney RA et al., J Clin Oncol 18: 2245ff, 2000.

