

Иксазомиб / Леналидомид / Дексаметазон ХА149 (европейский протокол) Множественная миелома

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м ²	Растворитель	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения
1, 8, 15, 22	Дексаметазон	40	-	0	-	перорально
1, 8, 15	Иксазомиб	4 (const)	-	0	-	перорально
1-21	Леналидомид	25 (const)	-	0	-	перорально

График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Дексаметазон																												
█							█							█							█							
Иксазомиб																												
█							█							█														
Леналидомид																												
█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█

Дополнительная информация

ПОВТОРНО НА:
29 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:
2

Примечание:

Иксазомиб также доступен по программе применения незарегистрированного препарата при тяжелой патологии.

Рекомендована профилактика образования тромбов.

Авторы: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#) (руководство «Протоколы химиотерапии 2016. Текущие протоколы и таргетная терапия» (17-е издание, Инсбрук).

Последнее изменение содержания: январь 2016 г.

Литература:

Moreau P. et al., Blood 126, 2015 (abstr. 727).

