

ESHAP ± R (локальний протокол) Ходжкінська лимфома

Дни терапії	Лекарственне средство	Дозировка, мг/м ²	Растворитель	Объем (мл)	Время введения	Путь введения
1-4	Цисплатин	25	0,9% NaCl	500	24 часа	внутривенно
5	Цитарабин	4000	0,9% NaCl	500	2 часа	внутривенно
1-4	Этопозид	60	0,9% NaCl	500	2 часа	внутривенно

График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Цисплатин																					
■	■	■	■																		
Цитарабин																					
				■																	
Этопозид																					
■	■	■	■																		

Дополнительная информация

ПОВТОРНО НА:
22 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:
6

Примечание:

Нозология - рецидив лимфомы Ходжкина, неходжкинских лимфом.

Протокол предназначен для отделения онкогематологии с группой адъювантных методов лечения, отделение лучевой терапии Национального института рака. Цель - предоставление диагностической и лечебной помощи больным с рецидивом лимфом в Национальном институте рака.

Важно - обязательное введение

Метилпреднизалон 500 мг, в/венно - день 1-4.

