

ICE ± R (локальний протокол) Ходжкінська лимфома

Дни терапії	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м ²	Растворитель	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения
2	Ифосфамид	5000	0,9% NaCl	500 мл	24 часа	внутривенно
2	Карбоплатин	AUC 5	5% Глюкоза	500 мл	30 минут	внутривенно
2	Месна	5000	0,9% NaCl	500 мл	24 часа	внутривенно
1-3	Этопозид	100	0,9% NaCl	500 мл	2 часа	внутривенно

График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Ифосфамид																					
	■																				
Карбоплатин																					
	■																				
Месна																					
	■																				
Этопозид																					
■	■	■																			

Дополнительная информация

ПОВТОРНО НА:
22 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:
6

Примечание:

Нозология - рецидив лимфомы Ходжкина, неходжкинских лимфом.

Протокол предназначен для отделения онкогематологии с группой адъювантных методов лечения, отделение лучевой терапии Национального института рака.

Цель - предоставление диагностической и лечебной помощи больным с рецидивом лимфом в Национальном институте рака.

Авторство: [Национальный институт рака](#)

