хемотека
ЦЕНТР ПЕРСОНАЛІЗОВАНОЇ ФАРМАЦІЇ

0800 402 022
050 440 90 62
office@chemoteka.com.ua

вул. Чигиринська, 21/11
Черкаси, 18030, Україна
chemoteka.com

MINE ± R (локальный протокол) Ходжкинская лимфома

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м^2	Растворитель	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения
1-3	Ифосфамид	1330	0,9% NaCl	500 мл	24 часа	внутривенно
1-3	Месна	1330	0,9% NaCl	500 мл	24 часа	внутривенно
1	Митоксантрон	8	0,9% NaCl	100 мл	1 час	внутривенно
1-3	Этопозид	65	0,9% NaCl	500 мл	2 часа	внутривенно

График введения препаратов:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Ифосфамид																						
	■	■	■																			
Месна																						
	■	■	■																			
Митоксантрон																						
	■																					
Этопозид																						
	■	■	■																			

Дополнительная информация

ПОВТОРНО НА:
22 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:
6

Примечание:
Нозология – рецидив лимфомы Ходжкина, неходжкинских лимфом.
Протокол предназначен для отделения онкогематологии с группой адъювантных методов лечения, отделение лучевой терапии Национального института рака.
Цель – предоставление диагностической и лечебной помощи больным с рецидивом лимфом в Национальном институте рака.
Важно – Месна вводить по схеме, затем 500 мг/сут в/венно, начиная через 4 часов после окончания инфузии ифосфамида, 1-3 день.
Авторство: Национальный институт рака