

Карбоплатин / Паклитаксел + Бевацизумаб ХС772 + ХА060 (европейский протокол) Рак яичника

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м ²	Растворитель	Объем (мл)	Время введения	Путь введения
1	Карбоплатин	AUC 6	5% Глюкоза	500	30 минут	внутривенно
1	Паклитаксел	175	0,9% NaCl	500	3 часа	внутривенно

График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Карбоплатин																					
Паклитаксел																					

Дополнительная информация

**ПОВТОРНО НА:
22 (день)**

**КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:
6**

Примечание:

Паклитаксел разводят до 0,3-1,2 мг/мл.

Расчет дозы Карбоплатина (формула Calvert):

Доза (мг) = целевая AUC x (СКФ + 25).

(*) Бевацизумаб: Начальную дозу вводят в течение 90 минут. В случае хорошей переносимости первой инфузии, вторую инфузию вводят в течение 60 минут. В случае хорошей переносимости 60-минутной инфузии, все последующие инфузии можно вводить в течение 30 минут.

Разведенные растворы Паклитаксела вводят через инфузионные системы без ПВХ.

Литература:

Burger et al., N Engl J Med 365: 2473ff, 2011.

