

# Карбоплатин / Паклитаксел + Бевацизумаб ХС772 + ХА060 (европейский протокол) Рак яичника

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м <sup>2</sup>	Растворитель	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения
1	Карбоплатин	AUC 6	5% Глюкоза	500 мл	30 минут	внутривенно
1	Паклитаксел	175	0,9% NaCl	500 мл	3 часа	внутривенно

## График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
<b>Карбоплатин</b>																					
<b>Паклитаксел</b>																					

## Дополнительная информация

**ПОВТОРНО НА:  
22 (день)**

**КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:  
6**

### Примечание:

Паклитаксел разводят до 0,3-1,2 мг/мл.

**Расчет дозы Карбоплатина (формула Calvert):**

**Доза (мг) = целевая AUC x (СКФ + 25).**

(\* **Бевацизумаб:** Начальную дозу вводят в течение 90 минут. В случае хорошей переносимости первой инфузии, вторую инфузию вводят в течение 60 минут. В случае хорошей переносимости 60-минутной инфузии, все последующие инфузии можно вводить в течение 30 минут.

Разведенные растворы Паклитаксела вводят через инфузионные системы без ПВХ.

**Литература:**

Burger et al., N Engl J Med 365: 2473ff, 2011.

