

GDP ± R (локальний протокол) Ходжкінська лимфома

| Дни терапії | Лекарственне средство | Дозировка, мг/м ² | Растворитель | Объем (мл / шт) | Время введения | Путь введения |
|-------------|-----------------------|------------------------------|--------------|-----------------|----------------|---------------|
| 1,8 | Гемцитабин | 1000 | 0,9% NaCl | 250 мл | 30 минут | внутривенно |
| 1-4 | Дексаметазон | 40 (const) | - | - | - | перорально |
| 1 | Карбоплатин | AUC 5 | 5% Глюкоза | 500 мл | 30 минут | внутривенно |

График введения препаратов:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Гемцитабин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ■ | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| Дексаметазон | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Карбоплатин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Дополнительная информация

ПОВТОРНО НА:
22 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:
6

Примечание:

Нозология - рецидив лимфомы Ходжкина, неходжкинских лимфом.

Протокол предназначен для отделения онкогематологии с группой адъювантных методов лечения, отделение лучевой терапии Национального института рака.

Авторство: [Национальный институт рака](#)

