

Леналидомид / Дексаметазон ХА149 (европейський протокол) Множественная миелома

| Дни терапии | Лекарственное средство | Дозировка, мг/м ² | Растворитель | Объем (мл / шт) | Время введения | Путь введения |
|--------------|------------------------|------------------------------|--------------|-----------------|----------------|---------------|
| 1, 8, 15, 22 | Дексаметазон | 40 (const) | - | 0 | - | перорально |
| 1-21 | Леналидомид | 25 (const) | - | 0 | - | перорально |

График введения препаратов:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Дексаметазон | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| █ | | | | | | | █ | | | | | | | | █ | | | | | | | | | | | | | |
| Леналидомид | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ |

Дополнительная информация

**ПОВТОРНО НА:
29 (день)**

**КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:
2**

Примечание:

Рекомендована профилактика образования тромбов.

Авторы: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#)
(руководство «Протоколы химиотерапии 2016. Текущие протоколы и таргетная терапия» (17-е издание, Инсбрук).

Последнее изменение содержания: январь 2016 г.

Литература:

Rajkumar S.V., Lancet Oncol 11: 29ff, 2010;
Benboubker L. et al., N Engl J Med 371: 906ff, 2014.

