

## PEP-C (локальний протокол) НХЛ хроническая

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м <sup>2</sup>	Растворитель	Объем (мл)	Время введения	Путь введения
1-30	Преднизолон	50 мг (const)	-	-	-	перорально
1-30	Прокарбазин	50 мг (const)	-	-	-	перорально
1-30	Циклофосфамид	50 мг (const)	-	-	-	перорально
1-30	Этопозид	50 мг (const)	-	-	-	перорально

### График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
<b>Преднизолон</b>																														
[График введения Преднизолона]																														
<b>Прокарбазин</b>																														
[График введения Прокарбазина]																														
<b>Циклофосфамид</b>																														
[График введения Циклофосфамида]																														
<b>Этопозид</b>																														
[График введения Этопозид]																														

### Дополнительная информация

ПОВТОРНО НА:  
31 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:  
постоянный прием

#### Примечание:

Нозология - рецидив лимфомы Ходжкина, неходжкинских лимфом.

Протокол предназначен для отделения онкогематологии с группой адъювантных методов лечения, отделение лучевой терапии Национального института рака.

Важно - препараты принимаются постоянно под контролем гемограммы еженедельно. При уровне лейкоцитов  $<3.0 \cdot 10^9/\text{л}$  - прекращение терапии до восстановления уровня лейкоцитов.

