

PEP-C (локальний протокол) НХЛ хроническая

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м ²	Растворитель	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения
1-30	Преднизолон	50 мг (const)	-	-	-	перорально
1-30	Прокарбазин	50 мг (const)	-	-	-	перорально
1-30	Циклофосфамид	50 мг (const)	-	-	-	перорально
1-30	Этопозид	50 мг (const)	-	-	-	перорально

График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Преднизолон																														
[График введения Преднизолон]																														
Прокарбазин																														
[График введения Прокарбазин]																														
Циклофосфамид																														
[График введения Циклофосфамид]																														
Этопозид																														
[График введения Этопозид]																														

Дополнительная информация

ПОВТОРНО НА:
31 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:
постоянный прием

Примечание:

Нозология - рецидив лимфомы Ходжкина, неходжкинских лимфом.

Протокол предназначен для отделения онкогематологии с группой адъювантных методов лечения, отделение лучевой терапии Национального института рака.

Важно - препараты принимаются постоянно под контролем гемограммы еженедельно. При уровне лейкоцитов $<3.0 \cdot 10^9/л$ - прекращение терапии до восстановления уровня лейкоцитов.

Авторство: [Национальный институт рака](#)

