

## СЕРР(В) (локальний протокол) Ходжкінська лимфома

Дни терапії	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м <sup>2</sup>	Растворитель	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения
1,15	Блеомицин	15	-	-	болюсно	внутривенно
1-10	Преднизолон	60	-	-	-	перорально
1-10	Прокарбазин	60	-	-	-	перорально
1,8	Циклофосфамид	600	0,9% NaCl	500 мл	1 час	внутривенно
1-3	Этопозид	70	0,9% NaCl	500 мл	1 час	внутривенно

### График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
<b>Блеомицин</b>																					
■														■							
<b>Преднизолон</b>																					
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■												
<b>Прокарбазин</b>																					
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■												
<b>Циклофосфамид</b>																					
■							■														
<b>Этопозид</b>																					
■	■	■																			

### Дополнительная информация

**ПОВТОРНО НА:  
22 (день)**

**КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:  
6**

**Примечание:**

Нозология - рецидив лимфомы Ходжкина, неходжкинских лимфом.

Протокол предназначен для отделения онкогематологии с группой адъювантных методов лечения, отделение лучевой терапии Национального института рака.

Важно - Месна (Mesna) 20% дозы Циклофосфамида, через 0, 4 и 8 ч. после приема Циклофосфамида.

Авторство: [Национальный институт рака](#)

