

# Помалидомид / Дексаметазон ХА149 (европейський протокол) Множественная миелома

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м <sup>2</sup>	Растворитель	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения
1, 8, 15, 22	Дексаметазон	40 (const)	-	0	-	перорально
1-21	Помалидомид	4 (const)	-	0	-	перорально

## График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
<b>Дексаметазон</b>																												
█							█								█													
<b>Помалидомид</b>																												
█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█

## Дополнительная информация

ПОВТОРНО НА:  
29 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:  
2

### Примечание:

Рекомендована профилактика образования тромбов.

Авторы: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#)

(руководство «Протоколы химиотерапии 2016. Текущие протоколы и таргетная терапия» (17-е издание, Инсбрук).

Последнее изменение содержания: январь 2016 г.

### Литература:

San-Miguel J.F. et al., Lancet Oncol 14: 1055ff, 2013.

