

## Бевацизумаб / Карбоплатин / Паклитаксел (локальный протокол) Рак легких

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м <sup>2</sup>	Растворитель	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения
1	Бевацизумаб	7,5 мг/кг	0,9% NaCl	100 мл	90 хвилини	внутривенно
1	Карбоплатин	AUC 6	5% Глюкоза	500 мл	30 хвилини	внутривенно
1	Паклитаксел	200	0,9% NaCl	500 мл	3 години	внутривенно

### График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
<b>Бевацизумаб</b>																					
<b>Карбоплатин</b>																					
<b>Паклитаксел</b>																					

### Дополнительная информация

**Примечание:**

Паклитаксел разводят до 0,3-1,2 мг/мл.

Сопутствующая медикация до Паклитаксела:

Премедикация: Дексаметазон, 20 мг внутривенно за 30 минут до Паклитаксела или Дексаметазона - 20 мг орально за 12 и 6 часов до Паклитаксела. Рекомендована дополнительная премедикация 50 мг Ранитидина и 30 мг Дифенгидрамина.

Разведенные растворы Паклитаксела вводят через инфузионные системы без ПВХ.

Расчет дозы Карбоплатина (формула Calvert):

Доза (мг) = целевая AUC x (СКФ + 25).

(\*) Бевацизумаб: Начальную дозу вводят в течение 90 минут. В случае хорошей переносимости первой инфузии, вторую инфузию вводят в течение 60 минут. В случае хорошей переносимости 60-минутной инфузии, все последующие инфузии можно вводить в течение 30 минут.

В соответствии с ЕМА, Бевацизумаб, как дополнение к химиотерапии препаратами платины, был утвержден в дозе 7,5 мг/кг или 15 мг/кг. Паспортная часть: нозология - рак легкого; код по мкб -10 - с 33, с 34.

Потенциальные пользователи - отделение опухолей органов грудной полости Национального института рака.

**Литература:**

Локальный протокол медицинской помощи и клинический маршрут больных раком легкого.

ПОВТОРНО НА:  
22 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:  
6

