

MVP с цитарабином (локальный протокол) Лимфома ЦНС

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м ²	Растворитель	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения
1	Винкрестин	1,4(*)	0,9% NaCl	100 мл	10 минут	внутривенно
1	Метотрексат	2500	0,9% NaCl	100 мл	15 минут	внутривенно
1-5	Прокарбазин	150	-	-	-	перорально
1,2	Цитарабин	3000	0,9% NaCl	250 мл	1 час	внутривенно

График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Винкрестин														
Метотрексат														
Прокарбазин														
Цитарабин														

Дополнительная информация

ПОВТОРНО НА:
15 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:
5

Примечание:

Первичная В-крупноклеточная лимфома ЦНС в соответствии с классификацией ВОЗ-2008. Протокол предназначен для отделения онкогематологии с группой адъювантных методов лечения, отделение лучевой терапии Национального института рака с целью оказания лечебной помощи больным на Первичную В-крупноклеточную лимфому ЦНС в Национальном институте рака.

Важно - через 24 часа после завершения основного цикла или лучевой терапии назначают Метотрексат эндолюмбально, вводится в свободные недели.

Авторство: [Национальный институт рака](#)

