

Цетуксимаб / Цисплатин (локальний протокол) Рак голови и шеи

| Дни терапии | Лекарственное средство | Дозировка, мг/м ² | Растворитель | Объем (мл / шт) | Время введения | Путь введения |
|-------------|------------------------|------------------------------|--------------|-----------------|----------------|---------------|
| 1, 8 | Цетуксимаб | 400 | 0,9% NaCl | 500 мл | 1 час | внутривенно |
| 1 | Цисплатин | 100 | 0,9% NaCl | 500 мл | 1 час | внутривенно |

График введения препаратов:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Цетуксимаб | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ■ | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| Цисплатин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Дополнительная информация

ПОВТОРНО НА:
22 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:
5

Примечание:

Локальный протокол медицинской помощи
больных на:

- рак губы;
- рак ротовой полости;
- рак ротоглотки;
- рак носоглотки;
- рак верхнечелюстной пазухи;
- рак слюнных желез.

Протокол предназначен для отделения опухолей
головы и шеи, отделение лучевой терапии и
отделение химиотерапии солидных опухолей
Национального института рака.

Важно! Изменение дозировки Цетуксимаба - 1
день цикла - 400 мг/м², а 8 день цикла - 250
мг/м².

Авторство: [Национальный институт рака](#)

