

Метотрексат / Блеомицин / Цисплатин (локальний протокол) Рак головы и шеи

| Дни терапии | Лекарственное средство | Дозировка, мг/м ² | Растворитель | Объем (мл / шт) | Время введения | Путь введения |
|-------------|------------------------|------------------------------|--------------|-----------------|----------------|---------------|
| 1, 8, 15 | Блеомицин | 10 | - | - | болюс | внутривенно |
| 1, 15 | Метотрексат | 40 | 0,9% NaCl | 100 мл | 15 минут | внутривенно |
| 1 | Цисплатин | 50 | 0,9% NaCl | 500 мл | 1 час | внутривенно |

График введения препаратов:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Блеомицин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ■ | | | | | | | ■ | | | | | | | ■ | | | | | | | |
| Метотрексат | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ■ | | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | |
| Цисплатин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Дополнительная информация

**ПОВТОРНО НА:
22 (день)**

**КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:
5**

Примечание:

Локальный протокол медицинской помощи больных на:

- рак губы;
- рак ротовой полости;
- рак ротоглотки;
- рак носоглотки;
- рак верхнечелюстной пазухи;
- рак слюнных желез.

Протокол предназначен для отделения опухолей головы и шеи, отделение лучевой терапии и отделение химиотерапии солидных опухолей Национального института рака.

Важно! Проводится при низко- и недифференцированных формах рака, рецидивирующего и/или метастазирующего рака.

Авторство: [Национальный институт рака](#)

