

Циклофосфамид / Доксорубицин / Винкристин / Цисплатин (локальний протокол) Рак голови и шеи

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м ²	Растворитель	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения
1	Винкристин	1	0,9% NaCl	100 мл	10 минут	внутривенно
1	Доксорубицин	30	0,9% NaCl	250 мл	1 час	внутривенно
1	Циклофосфамид	800	0,9% NaCl	500 мл	1 час	внутривенно
4	Цисплатин	100	0,9% NaCl	500 мл	2 часа	внутривенно

График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Винкристин																					
Доксорубицин																					
Циклофосфамид																					
Цисплатин																					

Дополнительная информация

**ПОВТОРНО НА:
22 (день)**

**КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:
5**

Примечание:

Локальный протокол медицинской помощи больных на:

- рак губы;
- рак ротовой полости;
- рак ротоглотки;
- рак носоглотки;
- рак верхнечелюстной пазухи;
- рак слюнных желез.

Протокол предназначен для отделения опухолей головы и шеи, отделение лучевой терапии и отделение химиотерапии солидных опухолей Национального института рака.

Важно! Протокол проводится при низко- и недифференцированных формах рака.

Месна (Mesna) 20% дозы Циклофосфамида, через 0, 4 и 8 часов после приема Циклофосфамида.

Авторство: [Национальный институт рака](#)

