

Циклофосфамид / Блеомицин / Винбластин / Карбоплатин (локальний протокол) Рак голови и шеи

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м ²	Растворитель	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения
1-3	Блеомицин	30	-	-	болюс	внутривенно
1	Винбластин	6	0,9% NaCl	100 мл	10 минут	внутривенно
4	Карбоплатин	AUC 5	5% Глюкоза	500 мл	30 минут	внутривенно
1	Циклофосфамид	800	0,9% NaCl	500 мл	1 час	внутривенно

График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Блеомицин																					
■	■	■																			
Винбластин																					
■																					
Карбоплатин																					
			■																		
Циклофосфамид																					
■																					

Дополнительная информация

**ПОВТОРНО НА:
22 (день)**

**КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:
5**

Примечание:

Локальный протокол медицинской помощи больных на:

- рак губы;
- рак ротовой полости;
- рак ротоглотки;
- рак носоглотки;
- рак верхнечелюстной пазухи;
- рак слюнных желез.

Протокол предназначен для отделения опухолей головы и шеи, отделение лучевой терапии и отделение химиотерапии солидных опухолей Национального института рака.

Важно! Протокол проводится при низко- и недифференцированных формах рака.

Месна (Mesna) 20% дозы Циклофосфамида, через 0, 4 и 8 часов после приема Циклофосфамида.

Авторство: [Национальный институт рака](#)

