хемотека
ЦЕНТР ПЕРСОНАЛІЗОВАНОЇ ФАРМАЦІЇ

0800 402 022
050 440 90 62
office@chemoteka.com.ua

вул. Чигиринська, 21/11
Черкаси, 18030, Україна
chemoteka.com

Циклофосфамид / Блеомицин / Винбластин / Карбоплатин (локальный протокол) Рак головы и шеи

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м^2	Растворитель	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения
1-3	Блеомицин	30	-	-	болюс	внутривенно
1	Винбластин	6	0,9% NaCl	100 мл	10 минут	внутривенно
4	Карбоплатин	AUC 5	5% Глюкоза	500 мл	30 минут	внутривенно
1	Циклофосфамид	800	0,9% NaCl	500 мл	1 час	внутривенно

График введения препаратов:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Блеомицин																						
Винбластин																						
Карбоплатин																						
Циклофосфамид																						

Дополнительная информация

ПОВТОРНО НА:
22 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:
5

Примечание:
Локальный протокол медицинской помощи больных на:
• рак губы;
• рак ротовой полости;
• рак ротоглотки;
• рак носоглотки;
• рак верхнечелюстной пазухи;
• рак слюнных желез.
Протокол предназначен для отделения опухолей головы и шеи, отделение лучевой терапии и отделение химиотерапии солидных опухолей Национального института рака.
Важно! Протокол проводится при низко- и недифференцированных формах рака.
Месна (Mesna) 20% дозы Циклофосфамида, через 0, 4 и 8 часов после приема Циклофосфамида.
Авторство: Национальный институт рака