

## FEC / Доцетаксел (режим PACS 01) ХС532 (FEC); ХС416 (Доцетаксел) (европейский протокол) - Часть 2 Рак молочной железы

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м <sup>2</sup>	Растворитель	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения
1	Доцетаксел	100	0,9% NaCl	250 мл	1 час	внутривенно

### График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
<b>Доцетаксел</b>																					

### Дополнительная информация

ПОВТОРНО НА:  
22 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:  
3

#### Примечание:

**Внимание!** Данная схема действительна и применяется после схемы - FEC / Доцетаксел (режим PACS 01) ХС532 (FEC); ХС416 (Доцетаксел) (европейский протокол) - Часть 1.

Доцетаксел разводят до 0,3-0,74 мг/мл.

#### Сопутствующая медикация:

Дексаметазон 8 мг орально 2 раза в день в течение 3 суток, начиная в 1 день перед приемом Доцетаксела.

#### Литература:

Roche H. et al., J Clin Oncol 24: 5664ff, 2006.

